

(休業4日以上の死傷者数)

常総労働基準監督署

業種		年		3年		同期比	
		死亡	休業	死亡	休業	死亡	休業
製造業	食料品		19		15		4
	木材・木製品		1		2		-1
	化学工業		3		1		2
	金属製品		9		6		3
	一般・電気・輸送用機械	1	4		5	1	-1
	その他		50		10		40
	小計	1	86		39	1	47
建設業	土木工事		3		1		2
	建築工事 (木造除く)		8		2		6
	木造建築工事		2		2		
	その他の工事		1		2		-1
	小計		14		7		7
陸上貨物運送事業			31		16		15
畜産業			2				2
小売業			4		6		-2
社会福祉施設			38		8		30
飲食店			1		2		-1
その他			24		18		6
計		1	200		96	1	104

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
4年	18	105	33	(1) 29	15								(1) 200

今年の全国安全週間の標語『安全は 急がず焦らず怠らず』

		規模別				事故の型別								合計
		規模 九人	四 九人	一〇 〇人	五 九人	一〇〇 人	墜 落・ 転 落	転 倒	激 突 さ れ	挟 まれ・ 巻 込 まれ	こ す れ・ 切 れ	交 通 事 故	動 作 の 反 動	
製 造 業	食 料 品	1	2	2	14	1	10	1	5			1	1	19
	木材・木製品				1							1		1
	化学工業	1	1		1		1		1			1		3
	金属製品	1	5	2	1	1	2		3	1			2	9
	一般・電気・ 輸送用機械		1	1	2			1	(1) 2				1	(1) 4
	そ の 他	1	4	4	41	2	1		3			1	43	50
	小 計	4	13	9	60	4	14	2	(1) 14	1		4	47	(1) 86
建 設 業	土木工事	1	2			1			1	1				3
	建築工事 (木造除く)	5	3			4			1	1	1		1	8
	木造建築工事	2				1	1							2
	その他の工事		1								1			1
	小 計	8	6			6	1		2	2	2		1	14
陸上貨物運送事業		3	22	5	1	5	5		2			5	14	31
畜 産 業			1	1			1		1					2
小 売 業		1	2		1		1		1				2	4
社会福祉施設			10	24	4		2	2		1	1		32	38
飲食店			1				1							1
そ の 他		2	11	2	9	1	6					8	9	24
計		18	66	41	75	16	31	4	(1) 20	4	3	17	105	(1) 200

※ 数値は、労働者死傷病報告より集計したものであり、()内は死亡者で内数です。

※ 陸上貨物運送事業は「道路貨物運送業」、「陸上貨物取扱業」を合わせたものをいいます。

STOP！熱中症

令和4年5月～9月

クールワークキャンペーン

— 熱中症予防対策の徹底を図ろう —

職場における熱中症により、毎年約20人が亡くなり、約600人が4日以上仕事を休んでいます。夏季を中心に「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組みましょう！

労働安全衛生法第24条第2項

STEP 1 □ WBGT値の把握

JIS規格に適合したWBGT指数計でWBGT値を測りましょう。

STEP 2 準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、測定したWBGT値に応じて次の対策を取りましょう。

□ WBGT値を下げるための設備、休憩場所の設置	暑熱環境に検討した対策（クーラー、休憩場所）を設置しましょう。休憩場所には水、冷たい飲み物、シャワー等や飲料水、扇風などを設置しましょう。暑熱環境に検討した通気性の良い服装なども着用しましょう。
□ 通気性の良い服装等	
□ 作業時間の短縮	WBGT値が高いときは、 暴発作業を控え、WBGT値に応じて作業の中止、または休息をとるなどの工夫をしましょう。
□ 暑熱反応	暑さに慣れるまでの間は 十分に休憩を取り、1週間程度かけて徐々に身体を暑さに慣らすこと です。特に、入職後や夏休み明けの方は注意が必要です！
□ 水分・塩分の摂取	のどが潤いていくまで 定期的に水分・塩分 を取りましょう。
□ プレファンリング	休憩間にも体温を下げる工夫をしましょう。
□ 健康診断結果に基づく措置	①糖尿病、②高血圧症、③心臓病、④腎不全、⑤肝臓病、⑥神経痛等の病気、⑦広範囲の皮膚疾患、⑧頭痛、⑨下痢などがある人と暑熱にかかりやすくなります。 医師の意見を聞いて人員配置についてみましょう。
□ 日常の健康管理など	前日はお酒の飲まず、よく休ましましょう。また、当日は朝食をしっかり取るようにしましょう。熱中症の具体的な症状について理解し、体調不良を早く気付くことができるようにしましょう。
□ 作業中の作業者の健康状態の確認	管理者をはじめ、作業員同士お互いの健康状態をよく確認するように。特に、入職後や夏休み明けの方作業開始前に確認を配りましょう。



WBGT測定器(ワット)







STEP 3 熱中症予防管理者等は、WBGT値を確認し、巡視とともに、次の事項を確認しましょう。

- WBGT値の**継続的確認**は実施されているか
- WBGT値に応じた**作業計画**となっているか
- 各作業者の**体調・暑熱順化への状況**に問題はないか
- 各作業者は**水分や塩分**をきちんと取っているか
- 作業の**中止や中断**をさせずにきついか

□ 異常時の措置

少しでも異常を感じたら～
いったん**作業を止め、休憩する**所へ入るべき、または救急車を呼ぶ
所へ入るまでは一人きりにしない



常設労働基準監督署からのお知らせ

熱中症関連

気温が高まるにつれて、熱中症のリスクが高まります！
特に注意していただきたいのは

- ・身体が慣れていない方
- ・あまり暑い場所に行かない労働者が暑い場所で作業したとき
- ・年齢が高い方が挙げられます。

対策として

- ・身体が慣れるよう1週間かけること、休憩時間を多くすること
- ・水分補給等の安全対策を図ることが挙げられます。

万が一、熱中症の疑いがあれば躊躇なく救急搬送しましょう。今年が断つても後から重症になるケースがあります。

茨城労働局管内では昨年熱中症の疑いにより、1名お亡くなりになる事故が発生しておりますので、今般は熱中症による災害を避渡し、ましよう。

化学物質関連

令和5年4月1日以降、化学物質の規制が強化されます。化学物質管理者の選任、SDS交付対象物質の追加、リスクアセスメント等実施しなければならない事項が増えますので、下の2次元コード又はURLから確認していただきますようよろしく

年齡別

年齢別	件数	率(%)
～19歳	3	1.5%
20～29歳	36	18.0%
30～39歳	(1) 29	14.5%
40～49歳	44	22.0%
50～59歳	41	20.5%
60歳～	47	23.5%

年齢が高いと筋力等の低下で
労災事故のリスクが高くなります！